Eficaz

Teppeki® es altamente eficaz frente a un amplio rango de especies de pulgones diferentes



Ensayo realizado en los laboratorios de **ISK**

Rápido cese de la alimentación
La alimentación se detiene en 1 hora
Dosis letal
< 1 hora de exposición

Gráfico 1:
Flonicamid provoca una rápida interrupción de la alimentación de los pulgones, que se traduce en la falta de producción de melaza.

Teppeki® : Resultados de eficacia



Usos Autorizados

Época tratamiento :
Tratamientos preventivos en Pre Floración o bien en Post Floración al inicio de la infestación **12 - 14 g/100 l**

Manzano
Plaga : *Dysaphis plantaginea, Aphis pomi*
Plazo seguridad : *21 días*

Peral
Plaga : *Dysaphis pyri, Dysaphis plantaginea, Aphis pomi*
Plazo seguridad : *21 días*

Melocotón, Nectarina
Plaga : *Myzus persicae, Myzus varians*
Plazo seguridad : *14 días*

Ciruelo
Plaga : *Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus schwartzi, Hyalopterus pruni*
Plazo seguridad : *35 días*

Teppeki está registrado también en los siguientes cultivos:
hortícolas (tomate, calabacín, calabaza, melón, sandía y pepino), cítricos, algodonero, ornamentales herbáceas y ornamentales leñosas.

Teppeki® : Producto y Marca Registrada por ISK BIOSCIENCES

Belchim Crop Protection España
Avda. de Europa, 24 | Edif. Torona, B 3ªA | Parque empresarial La Moraleja | 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 010 64 17 | Fax: +34 91 010 61 16 | www.belchim.es

teppeki®

Frutales **sin pulgón**

BELCHIM CROP PROTECTION

teppeki® Frutales sin pulgón

Único

Flonicamid : una molécula única

Teppeki® es un aficida sistémico (50% de Flonicamid), que pertenece a la familia de las Piridinocarboxamidas.



Flonicamid : un modo de acción único

Actúa como inhibidor de la alimentación, **único representante del grupo 29 (clasificación IRAC).**
Actúa por contacto e ingestión. Tiene sistemia ascendente y efecto translaminar.



efecto translaminar



sistemia ascendente



Duradero

Respeto de los auxiliares

Teppeki® es un aficida específico. Tiene un alto grado de respeto hacia los depredadores naturales de pulgones y otras plagas presentes en el cultivo.



Teppeki® es una especialidad de futuro

- **Excelente eficacia en aplicación preventiva**
- **Protección de los nuevos brotes**
- **Persistencia de acción (de 3 semanas a 1 mes)**

Auxiliares tolerantes a Flonicamid

Especie

Adalia bipunctata
Amblyseius californicus
Amblyseius cucumeris
Amblyseius degenerans
Amblyseius swirskii
Anthocoris nemoralis
Aphidius colemani
Aphidoletes aphidimyza
Apis mellifera
Atheta coriaria
Bombus terrestris
Chrysoperla carnea
Coccinella septempuntata
Cryptolaemus montruizieri
Encarsia formosa
Episyrphus balteatus
Hypoaspis miles
Hypoaspis miles &
aculeifer
Kampidromus aberrans
Macrolophus caliginosus
Nesidiocoris tenuis
Orius laevigatus
Phytoseiulus persimilis
Typhlodromus pyri